

Nr.	Wissenschaftlich	Name Deutsch	Schutzstatus					Artstatus (TH)			Bestand		Trend	
			VSRL	BNatG	RL T	RL D	SPEC	Kat	Jahr	Brut	Thüringen	Deutschland		
1	<i>Accipiter gentilis</i>	Habicht		§§		*	-	A	J Z W	4	200 BP	11.000-13.000 BP		
2	<i>Accipiter nisus</i>	Sperber		§§		*	-	A	J Z W	4	300 BP	15.000-21.000 BP	↗	
3	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Drosselrohrsänger		§§	2	V	-	A	Z	3	50-70 sM	6.200-8.600 sM	↗	
4	<i>Acrocephalus paludicola</i>	Seggenrohrsänger	Anh.1	§§		1	1	A	z		0 sM / ? Ind.	6-7 sM	↗	
5	<i>Acrocephalus palustris</i>	Sumpfrohrsänger		§		*	--	A	Z	4	? sM	470.000-660.000 sM		
6	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Schilfrohrsänger		§§	2	2	--	A	Z	2	10-20 sM	15.000-17.000 sM	↗	
7	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Teichrohrsänger		§		*	--	A	Z	4	? sM	170.000-230.000 sM	↘	
8	<i>Actitis hypoleucos</i>	Flussuferläufer		§§	1	2	3	A	Z	(1)	? BP / ? Ind.	260-330 BP		
9	<i>Aegithalos caudatus</i>	Schwanzmeise		§		*	-	A	J Z W	4	? BP	190.000-270.000 BP		
10	<i>Aegolius funereus</i>	Rauhfußkauz	Anh.1	§§	3	*	-	A	J	3	150-400 BP	1.800-2.600 BP		
11	<i>Alauda arvensis</i>	Feldlerche		§		3	3	A	J Z w	4	100.000-130.000 BP	2.100.000-3.200.000 BP	↘	
12	<i>Alcedo atthis</i>	Eisvogel	Anh.1	§§	3	*	3	A	J	3	400 BP	5.600-8.000 BP		
13	<i>Anas acuta</i>	Spießente		§		3	3	A	Z W	(1)	0 BP / ? Ind.	37-40 BP		
14	<i>Anas clypeata</i>	Löffelente		§	2	3	3	A	Z w	2	0-2 BP / ? Ind.	2.300-2.500	↘	
15	<i>Anas crecca</i>	Krickente		§	2	3	-	A	J Z W	2	2 BP / ? Ind.	4.700-5.400 BP		
16	<i>Anas penelope</i>	Pfeifente		§		R	--	A	Z w		0 BP / ? Ind.	20 BP		
17	<i>Anas platyrhynchos</i>	Stockente		§		*	-	A	J Z W	4	6.000 BP / ? Ind.	210.000-470.000 BP		
18	<i>Anas querquedula</i>	Knäkente		§§	2	2	3	A	Z	2	1-3 BP / ? Ind.	1.200 - 1.500 BP		
19	<i>Anas strepera</i>	Schnatterente		§	3	*	3	A	Z w	2	23 BP / ? Ind.	3.300-4.000 BP		
20	<i>Anser albifrons</i>	Bläßgans	Anh.1	§		*	-	A	Z W		0 BP / ? Ind.	0 BP		
21	<i>Anser anser</i>	Gaugans		§		R	*	-	A	J Z	2	23 BP / ? Ind.	17.000-20.000 BP	↗
22	<i>Anser erythropus</i>	Zwerggans	Anh.1	§		*	1	A	A		0 BP / 1-10 Ind.	0 BP		
23	<i>Anser fabalis</i>	Saatgans		§		*	--	A	Z W		0 BP / ? Ind.	0 BP		
24	<i>Anthus campestris</i>	Brachpieper	Anh.1	§§	1	1	3	A	z	1	4-6 RP	900-1.300 BP	↘	
25	<i>Anthus cervinus</i>	Rotkehlpieper		§		*	-	A	z		0 BP / ? Ind.	0 BP		
26	<i>Anthus pratensis</i>	Wiesenpieper		§	3	V	--	A	Z w	3	600-1.200 BP	96.000-130.000 BP	↘	
27	<i>Anthus spinoletta</i>	Wasserpieper / Bergpieper		§		*	-	A	z w		0 BP / ? Ind.	0 BP		
28	<i>Anthus trivialis</i>	Baumpieper		§		V	-	A	Z	4	? BP	500.000-700.000 BP	↘	
29	<i>Apus apus</i>	Mauersegler		§		*	-	A	Z	4	? BP	310.000-410.000 BP	↘	
30	<i>Aquila pomarina</i>	Schreiadler	Anh.1	§§		1	2	A	z		0 BP / ? Ind.	111 BP		
31	<i>Ardea cinerea</i>	Graureiher / Fischreiher		§		*	-	A	J Z W	4	700 BP / ? Ind.	27.000-28.000 BP	↗	
32	<i>Arenaria interpres</i>	Steinwälzer		§§		2	-	A	z		0 BP / ? Ind.	1-5 BP		
33	<i>Asio flammeus</i>	Sumpfohreule	Anh.1	§§		1	3	A	z w	1	0 BP / ? Ind.	68-175 BP		
34	<i>Asio otus</i>	Waldohreule		§§		*	-	A	J Z W	4	? BP	26.000-32.000 BP	↘	
35	<i>Athene noctua</i>	Steinkauz		§§	1	2	3	A	J	2	7 BP	8.200-8.400 BP	↗	
36	<i>Aythya ferina</i>	Tafelente		§		*	2	A	J Z W	3	130 BP / ? Ind.	3.300-4.400 BP	↘	
37	<i>Aythya fuligula</i>	Reiherente		§		*	3	A	J Z W	4	320 BP / ? Ind.	12.000-15.000 BP	↗	
38	<i>Aythya marila</i>	Bergente		§		R	3	A	z w		0 BP / ? Ind.	0-5 BP		
39	<i>Aythya nyroca</i>	Moorente	Anh.1	§§		1	1	A	z	0	0 BP / ? Ind.	2-9 BP	↗	
40	<i>Bombicilla garrulus</i>	Seidenschwanz		§		*	-	A	Z W		0 BP / ? Ind.	0 BP		
41	<i>Bonasia bonasia</i>	Haselhuhn	Anh.1	§	1	2	-	A	J	0	7-12 Ind.	1.300-1.900 BP	↗	
42	<i>Botaurus stellaris</i>	Rohrdommel	Anh.1	§§	1	2	3	A	z w	1	2 sM / ? Ind.	580-640 sM		
43	<i>Branta leucotis</i>	Weißwangengans	Anh.1	§		*	--	A	A		0 BP / 10 Ind.	193 BP	↗	
44	<i>Bubo bubo</i>	Uhu	Anh.1	§§	2	*	3	A	J	3	70-80 BP	1.400-1.500 BP	↗	
45	<i>Bucephala clangula</i>	Schellente		§		R	*	-	A	Z w	2	3 BP / ? Ind.	2.300-3.200 BP	
46	<i>Buteo buteo</i>	Mäusebussard		§§		*	-	A	J Z W	4	? BP	77.000-110.000 BP	↗	
47	<i>Buteo lagopus</i>	Rauhfußbussard		§§		*	-	A	Z W		0 BP / ? Ind.	0 BP		
48	<i>Calidris alba</i>	Sanderling		§		*	-	A	z		0 BP / ? Ind.	0 BP		
49	<i>Calidris alpina</i>	Alpenstrandläufer		§§		1	3	A	Z		0 BP / ? Ind.	8-14 BP		
50	<i>Calidris canutus</i>	Knutt		§		*	3	A	z		0 BP / ? Ind.	0 BP		
51	<i>Calidris ferruginea</i>	Sichelstrandläufer		§		*	ne	A	Z		0 BP / ? Ind.	0 BP		
52	<i>Calidris minuta</i>	Zwergstrandläufer		§		*	-	A	Z		0 BP / ? Ind.	0 BP		
53	<i>Calidris temminckii</i>	Temminckstrandläufer		§		*	-	A	Z		0 BP / ? Ind.	0 BP		
54	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Ziegenmelker	Anh.1	§§	1	3	2	A	Z	2	10-20 BP	5.600-6.400 BP		
55	<i>Carduelis [flammea] cabaret</i>	Alpenbirkenzeisig		§		*	-	A	J	2	? BP / ? Ind.	? BP		
56	<i>Carduelis cannabina</i>	Bluthänfling		§		V	--	A	J Z w	4	? BP	440.000-580.000 BP		
57	<i>Carduelis carduelis</i>	Stieglitz		§		*	-	A	J Z w	4	? BP	350.000-510.000 BP		
58	<i>Carduelis chloris</i>	Grünfink		§		*	--	A	J	4	? BP	1.700.000-2.600.000 BP		
59	<i>Carduelis flammea</i>	Birkenzeisig		§		*	-	A	z w		30-40 BP	11.000-15.000 BP	↗	
60	<i>Carduelis flavirostris</i>	Berghänfling		§		*	-	A	z w		0 BP / ? Ind.	0 BP		
61	<i>Carduelis spinus</i>	Erlenzeisig		§		*	--	A	J Z W	3	? BP	31.000-56.000 BP		
62	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Karmingimpel		§§		R	*	-	A	z	2	5 sM	470-520 BP	
63	<i>Casmerodius albus (Egretta alba)</i>	Silberreiher	Anh.1	§§		*	-	A	z w		0 BP / ? Ind.	0 BP	↗	
64	<i>Certhia brachydactyla</i>	Gartenbaumläufer		§		*	--	A	J	4	? BP	440.000-530.000 BP		
65	<i>Certhia familiaris</i>	Waldbaumläufer		§		*	-	A	J	4	? BP	260.000-340.000 BP		
66	<i>Charadrius dubius</i>	Flussregenpfeifer		§§	3	*	-	A	Z	3	? BP / ? Ind.	4.500-4.600 BP		
67	<i>Charadrius hiaticula</i>	Sandregenpfeifer		§§		1	--	A	Z	(1)	? BP / ? Ind.	890-920 BP		
68	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Weißflügelseeschwalbe		§§		0	-	A	z		0 BP / ? Ind.	0-3 BP		
69	<i>Chlidonias niger</i>	Trauerseeschwalbe	Anh.1	§§		1	3	A	Z	0	0 BP / ? Ind.	760-790 BP		
70	<i>Ciconia ciconia</i>	Weißstorch	Anh.1	§§	2	3	2	A	Z	3	24 HP	4.200-4.300 BP		
71	<i>Ciconia nigra</i>	Schwarzstorch	Anh.1	§§	2	*	2	A	Z	3	52 RP	500-530 BP	↗	
72	<i>Cinclus cinclus</i>	Wasseramsel		§		*	-	A	J	3	? BP	9.200-13.000 BP		
73	<i>Circus aeruginosus</i>	Rohrweihe	Anh.1	§§	3	*	-	A	Z	3	100-130 BP	5.900-7.900 BP		
74	<i>Circus cyaneus</i>	Kornweihe	Anh.1	§§	0	2	3	A	Z W	(1)	0 BP / ? Ind.	52-66 BP		
75	<i>Circus pygargus</i>	Wiesenweihe	Anh.1	§§	1	2	-	A	Z	(1)	0-2 BP / ? Ind.	410-470 BP		
76	<i>Clangula hyemalis</i>	Eisente		§		*	-	A	z w		0 BP / ? Ind.	0 BP		
77	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Kernbeißer		§		*	-	A	J Z W	4	? BP	190.000-280.000 BP		
78	<i>Columba livia f. domestica</i>	Haustaube / Straßentaube		§		*	-	C	J	a	? BP	180.000-250.000 BP		
79	<i>Columba oenas</i>	Hohltaube		§		*	--	A	Z	3	? BP	55.000-69.000 BP	↗	
80	<i>Columba palumbus</i>	Ringeltaube		§		*	--	A	J Z w	4	? BP	2.200.000-2.600.000 BP	↗	
81	<i>Corvus corax</i>	Kolkrabe		§		*	-	A	J	4	850-1000 BP	10.000-12.000 BP	↗	
82	<i>Corvus cornix</i>	Nebelkrähe		§		*	-	A	z w	(1)	0 BP / ? Ind.	63.000-84.000 BP		

Nr.	Name		Schutzstatus					Artstatus (TH)			Bestand		Trend
	Wissenschaftlich	Deutsch	VSRL	BNatG	RL T	RL D	SPEC	Kat	Jahr	Brut	Thüringen	Deutschland	
83	<i>Corvus corone</i>	Rabenkrähe		§		*	-	A	J	4	? BP	320.000-400.000 BP	↗
84	<i>Corvus frugilegus</i>	Saatkrähe		§	0	*	-	A	Z W	1	12 BP	68.000-70.000 BP	↗
85	<i>Corvus monedula</i>	Dohle		§	3	*	--	A	J Z W	3	560-600 BP	100.000-110.000 BP	↗
86	<i>Coturnix coturnix</i>	Wachtel		§	3	*	3	A	Z	4	? BP	18.000-38.000 BP	↗
87	<i>Orex crex</i>	Wachtelkönig	Anh.1	§§	1	2	1	A	Z	3	40-80 sM	1.300-1.900 sM	↗
88	<i>Cuculus canorus</i>	Kuckuck		§		V	-	A	Z	4	470-910 Ind.	65.000-92.000 Ind.	↗
89	<i>Cygnus columbianus</i>	Zwergschwan	Anh.1	§			3	A	A		0 BP / ? Ind.	0 BP	↗
90	<i>Cygnus cygnus</i>	Singschwan	Anh.1	§§		R	--	A	z W		0 BP / ? Ind.	21 BP	↗
91	<i>Cygnus olor</i>	Höckerschwan		§		V	--	A	J Z W	4	160 BP / 650 Ind.	9.500-12.000 BP	↗
92	<i>Delichon urbica</i>	Mehlschwalbe		§	3	V	3	A	Z	4	? BP	830.000-1.200.000 BP	↘
93	<i>Dendrocopos major</i>	Buntspecht		§		*	-	A	J z	4	? BP	550.000-740.000 BP	↗
94	<i>Dendrocopos medius</i>	Mittelspecht	Anh.1	§§	3	*	--	A	J	3	900-1.200 BP	25.000-56.000 BP	↗
190	<i>Dryobates minor</i>	Kleinspecht		§		V	-	A	J	4	? BP	26.000-35.000 BP	↘
95	<i>Dryocopus martius</i>	Schwarzspecht	Anh.1	§§		*	-	A	J	4	1.100-1.300 BP	30.000-40.000 BP	↗
96	<i>Egretta garzetta</i>	Seidenreiher	Anh.1	§§			-	A	A		0 BP / 1-2 Ind.	0 BP	↗
97	<i>Emberiza cia</i>	Zippammer		§§	R	1	3	A		(1)	0 BP / ? Ind.	350-440	↗
98	<i>Emberiza calandra</i>	Graumammer		§§	3	3	2	A	J	3	600-750 BP	21.000-31.000 BP	↗
99	<i>Emberiza citrinella</i>	Goldammer		§		*	--	A	J Z W	4	? BP	1.200.000-2.000.000 BP	↗
100	<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolan	Anh.1	§§	0	3	2	A	z	1	0 BP / ? Ind.	10.000-14.000 BP	↗
101	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Rohrhammer		§		*	-	A	Z w	4	? BP	300.000-380.000 BP	↗
102	<i>Erithacus rubecula</i>	Rotkehlchen		§		*	--	A	J Z w	4	? BP	2.800.000-3.400.000 BP	↗
103	<i>Eudromias morinellus</i>	Mornellregenpfeifer		§§		0	-	A	a		0 BP / 10-40 Ind.	0 BP	↗
104	<i>Falco columbarius</i>	Merlin	Anh.1	§§			-	A	z w		? Ind.	0 BP	↗
105	<i>Falco peregrinus</i>	Wanderalke	Anh.1	§§	2	*	-	A	J z w	2	32 BP	810-840 BP	↗
106	<i>Falco rusticolus</i>	Gerfalke		§§			3	A	A	2	0 BP / 0-1 Ind.	0 BP	↗
107	<i>Falco subbuteo</i>	Baumfalke		§§	2	3	-	A	Z	3	30 BP	2.600-3.400 BP	↘
108	<i>Falco tinnunculus</i>	Turmfalke		§§		*	3	A	J Z W	4	? BP	43.000-65.000 BP	↗
109	<i>Ficedula albicollis</i>	Halsbandschnäpper	Anh.1	§§	R	3	--	A	z	(1)	0-1 sM	3.500-5.000 BP	↗
110	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Trauerschnäpper		§		*	--	A	Z	4	? BP	180.000-250.000 BP	↘
111	<i>Ficedula parva</i>	Zwergschnäpper	Anh.1	§§	R	*	-	A	z	2	3-6 sM	1.900-3.100 BP	↘
112	<i>Fringilla coelebs</i>	Buchfink		§		*	--	A	J Z w	4	? BP	9.200.000-11.000.000 BP	↗
113	<i>Fringilla montifringilla</i>	Bergfink		§			-	A	Z w		? Ind.	0 BP	↗
114	<i>Fulica atra</i>	Bleßralle, Bläßhuhn		§		*	-	A	J Z W	4	2.200 BP / ? Ind.	78.000-130.000 BP	↗
115	<i>Galerida cristata</i>	Haubenlerche		§§	1	1	3	A	J	3	100 BP	5.200-7.500 BP	↗
116	<i>Gallinago gallinago</i>	Bekassine		§§	1	1	3	A	Z	3	50-60 BP / ? Ind.	5.700-6.600 BP	↘
117	<i>Gallinula chloropus</i>	Teichralle / Teichhuhn		§§	3	V	-	A	J Z w	3	350 BP / ? Ind.	31.000-43.000 BP	↘
118	<i>Garrulus glandarius</i>	Eichelhäher		§		*	-	A	J Z w	4	? BP	440.000-560.000 BP	↗
119	<i>Gavia arctica</i>	Prachtaucher	Anh.1	§			3	A	z w		0 BP / ? Ind.	0 BP	↗
120	<i>Gavia stellata</i>	Sternaucher	Anh.1	§			3	A	z		0 BP / ? Ind.	0 BP	↗
121	<i>Glaucidium passerinum</i>	Sperlingskauz	Anh.1	§§		*	-	A	J	3	240 BP	1.600-3.400 BP	↗
122	<i>Grus grus</i>	Kranich	Anh.1	§§		*	2	A	Z w		1-2 BP	5.200-5.400 BP	↗
123	<i>Haematopus ostralegus</i>	Austernfischer		§		*	--	A	z		0 BP / ? Ind.	31.000 BP	↗
124	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Seeadler	Anh.1	§§		*	1	A	z w		1 BP	494-500 BP	↗
125	<i>Hippolais icterina</i>	Gelbspötter		§		*	--	A	Z	4	? BP	220.000-330.000 BP	↗
126	<i>Hirundo rustica</i>	Rauchschwalbe		§	3	V	3	A	Z	4	? BP	1.000.000-1.400.000 BP	↘
127	<i>Ixobrychus minutus</i>	Zwergdommel	Anh.1	§§	0	1	3	A	z	1	8 sM / ? Ind.	99-159 sM	↗
128	<i>Jynx torquilla</i>	Wendehals		§§	2	2	3	A	Z	3	? BP	9.900-15.000 BP	↗
129	<i>Lanius collurio</i>	Neuntöter	Anh.1	§		*	3	A	Z	4	? BP	120.000-150.000 BP	↗
130	<i>Lanius excubitor</i>	Raubwürger		§§	1	2	3	A	J z w	3	100-130 BP	1.900-2.400 BP	↗
131	<i>Larus argentatus</i>	Silbermöwe		§		*	--	A	Z W	(1)	0 BP / ? Ind.	44.000-45.000 BP	↗
132	<i>Larus cachinnans</i>	Steppenmöwe		§		R	--	A	Z w		0 BP / ? Ind.	16-21 BP	↗
133	<i>Larus canus</i>	Sturmmöwe		§		*	2	A	Z W	(1)	0-1 BP / ? Ind.	22.000-23.000 BP	↗
134	<i>Larus fuscus</i>	Heringsmöwe		§		*	--	A	z w		0 BP / ? Ind.	38.000 BP	↗
135	<i>Larus marinus</i>	Mantelmöwe		§		R	--	A	z w		0 BP / ? Ind.	36 BP	↗
136	<i>Larus melanocephalus</i>	Schwarzkopfmöwe	Anh.1	§		*	-	A	z	(1)	? BP / ? Ind.	229-254 BP	↗
137	<i>Larus michahellis</i>	Mittelmeermöwe		§		*	-	A	z w		0 BP / ? Ind.	43-67 BP	↗
138	<i>Larus minutus</i>	Zwergmöwe	Anh.1	§		R	3	A	z		0 BP / ? Ind.	0 BP	↗
139	<i>Larus ndibundus</i>	Lachmöwe		§		*	--	A	J Z w	3	? BP / ? Ind.	140.000-150.000 BP	↘
140	<i>Limosa lapponica</i>	Pfuhlschnepfe	Anh.1	§			-	A	z		0 BP / ? Ind.	0 BP	↗
141	<i>Limosa limosa</i>	Uferschnepfe		§§	0	1	2	A	z	(1)	0 BP / ? Ind.	4.700 BP	↗
142	<i>Locustella fluviatilis</i>	Schlagschwirl		§	R	*	--	A	Z	3	60-80 sM	5.800-8.700 sM	↗
143	<i>Locustella luscinioides</i>	Rohrschwirl		§§	R	*	--	A	Z	2	14-18 sM	5.000-6.000 sM	↗
144	<i>Locustella naevia</i>	Feldschwirl		§		V	--	A	Z	4	? sM	63.000-90.000 sM	↗
145	<i>Loxia curvirostra</i>	Fichtenkreuzschnabel		§		*	-	A	J Z W	3	? BP	33.000-91.000 BP	↗
146	<i>Lullula arborea</i>	Heidelerche	Anh.1	§§	2	3	2	A	Z	V	? BP	44.000-60.000 BP	↗
147	<i>Luscinia luscinia</i>	Sprosser		§		*	--	A	A		0-3 sM	22.000-33.000 BP	↗
148	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Nachtigall		§		*	--	A	Z	3	? BP	94.000-120.000 BP	↗
149	<i>Luscinia svecica</i>	Blaukehlchen	Anh.1	§§	3	V	-	A	Z	3	130-160 BP	7.400-8.300 BP	↗
150	<i>Lymnocyrtus minimus</i>	Zwergschnepfe		§§		*	3	A	Z w		0 BP / ? Ind.	0 BP	↗
151	<i>Melanitta fusca</i>	Samtente		§			3	A	z w		0 BP / ? Ind.	0 BP	↗
152	<i>Melanitta nigra</i>	Trauerente		§			-	A	z w		0 BP / ? Ind.	0 BP	↗
153	<i>Mergellus albellus</i>	Zwergsäger	Anh.1	§			3	A	z w		0 BP / ? Ind.	0 BP	↗
154	<i>Mergus merganser</i>	Gänsesäger		§		2	-	A	Z W	0	0 Bp / ? Ind.	590-700 BP	↗
155	<i>Mergus serrator</i>	Mittelsäger		§		*	-	A	Z w		0 Bp / ? Ind.	390-420 BP	↗
156	<i>Merops apiaster</i>	Bienenfresser		§§		*	3	A	A	(1)	6 BP	535-574 BP	↗
157	<i>Milvus migrans</i>	Schwarzmilan	Anh.1	§§	3	*	3	A	Z	4	? BP	5.000-7.500 BP	↗
158	<i>Milvus milvus</i>	Rotmilan	Anh.1	§§	3	*	2	A	J Z w	4	1000 BP	10.000-14.000 BP	↗
159	<i>Motacilla alba</i>	Bachstelze		§		*	-	A	Z w	4	? BP	680.000-840.000 BP	↗
160	<i>Motacilla [flava] thunbergi</i>	Nordische Schafstelze		§			-	A	z		0 BP / ? Ind.	0 BP	↗
161	<i>Motacilla cinerea</i>	Gebirgstelze		§		*	-	A	Z w	3	? BP	33.000-43.000 BP	↗
162	<i>Motacilla flava</i>	Wiesenschafstelze		§	3	*	-	A	Z	3	500-1000 BP	12.000-15.000 BP	↗
163	<i>Muscicapa striata</i>	Grauschnäpper		§		*	3	A	Z	4	? BP	230.000-320.000 BP	↘

Nr.	Name		Schutzstatus					Artstatus (TH)		Bestand		Trend		
	Wissenschaftlich	Deutsch	VSRL	BNatG	RL T	RL D	SPEC	Kat	Jahr	Brut	Thüringen		Deutschland	
164	<i>Netta rufina</i>	Kolbenente		§	2	*	-	A	Z	2	1 BP / ? Ind.	530-570 BP		
165	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Tannenhäher		§		*	-	A	J Z	3	? BP	9.700-16.000 BP	↔	
166	<i>Numenius arquatus</i>	Großer Brachvogel		§§	1	1	2	A	J Z w	1	1 RP / ? Ind.	3.300 BP	↔	
167	<i>Numenius phaeopus</i>	Regenbrachvogel		§				-	A	z	0 BP / ? Ind.	0 BP		
168	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Steinschmätzer		§	1	1	3	A	Z	2	40 BP	3.800-5.600 BP	↔	
169	<i>Oriolus oriolus</i>	Pirol		§		V	-	A	Z	4	? BP	41.000-64.000 BP		
170	<i>Pandion haliaetus</i>	Fischadler	Anh.1	§§	0	3	3	A	Z	(1)	1 BP / ? Ind.	501-502 BP	↔	
171	<i>Panurus biarmicus</i>	Bartmeise		§		*	-	A	J z w	2	1-2 BP	2.500-3.000 BP		
172	<i>Parus ater</i>	Tannenmeise		§		*	-	A	J Z w	4	? BP	1.400.000-1.900.000 BP		
173	<i>Parus caeruleus</i>	Blaumeise		§		*	--	A	J Z W	4	? BP	2.600.000-3.300.000 BP		
174	<i>Parus cristatus</i>	Haubenmeise		§		*	2	A	J	3	? BP	340.000-450.000 BP	↔	
175	<i>Parus major</i>	Kohlmeise		§		*	-	A	J Z W	4	? BP	4.600.000-5.700.000 BP		
176	<i>Parus montanus</i>	Weidenmeise		§		*	-	A	J	4	? BP	170.000-220.000 BP		
177	<i>Parus palustris</i>	Sumpfmehse		§		*	3	A	J	4	? BP	340.000-480.000 BP	↔	
178	<i>Passer domesticus</i>	Hausperling		§		V	3	A	J	4	? BP	5.600.000-11.000.000 BP		
179	<i>Passer montanus</i>	Feldperling		§		V	3	A	J	4	? BP	1.000.000-1.600.000 BP		
180	<i>Perdix perdix</i>	Rebhuhn		§	2	2	3	A	J	3	? BP	86.000-93.000 BP	↔	
181	<i>Pernis apivorus</i>	Wespenbussard	Anh.1	§§		V	--	A	Z	3	70-90 BP	3.800-5.000 BP		
182	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Kormoran		§		*	-	A	J Z W	3	0-30 BP / 1000 Ind.	23.500-23.700 BP	↔	
183	<i>Philomachus pugnax</i>	Kampfläufer	Anh.1	§§		1	2	A	Z		0 W / ? Ind.	17-37 W		
184	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Hausrotschwanz		§		*	-	A	Z w	4	? BP	640.000-850.000 BP		
185	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Gartenrotschwanz		§		*	2	A	Z	4	? BP	110.000-160.000 BP		
186	<i>Phylloscopus collybita</i>	Zilpzalp		§		*	-	A	Z	4	? BP	2.800.000-3.700.000 BP		
187	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Waldlaubsänger		§		*	2	A	Z	4	? BP	280.000-400.000 BP		
188	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fitis		§		*	-	A	Z	4	? BP	1.800.000-2.400.000 BP	↔	
189	<i>Pica pica</i>	Elster		§		*	-	A	J	4	? BP	280.000-360.000 BP		
191	<i>Picus canus</i>	Grauspecht	Anh.1	§§		2	3	A	J	3	300-400 BP	13.000-17.000 BP		
192	<i>Picus viridis</i>	Grünspecht		§§		*	2	A	J	4	? BP	40.000-51.000 BP	↔	
193	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Schneeammer						-	A	z	0 BP / 0-1 Ind.	0 BP		
194	<i>Pluvialis apricaria</i>	Goldregenpfeifer	Anh.1	§§		1	--	A	Z		0 BP / ? Ind.	8 BP		
195	<i>Pluvialis squatarola</i>	Kiebitzregenpfeifer		§				-	A	z	0 BP / ? Ind.	0 BP		
196	<i>Podiceps auritus</i>	Ohrentaucher	Anh.1	§§		1	3	A	z	0	0 BP / ? Ind.	0-2 BP		
197	<i>Podiceps cristatus</i>	Haubentaucher		§		*	-	A	J Z w	4	300 BP / ? Ind.	19.000-22.000 BP	↔	
198	<i>Podiceps grisegena</i>	Rothaltaucher		§§		R	*	-	A	Z w	1	0-1 BP / ? Ind.	1.600-2.700 BP	
199	<i>Podiceps nigricollis</i>	Schwarzhalstaucher		§§		2	*	-	A	z	2	74 BP / ? Ind.	930-1.500 BP	↔
200	<i>Porzana parva</i>	Kleines Sumpfhuhn	Anh.1	§§		0	1	--	A	Z	(1)	0 BP / ? Ind.	37-53 BP	↔
201	<i>Porzana porzana</i>	Tüpfelsumpfhuhn	Anh.1	§§		1	1	--	A	Z	1	1-2 sM / ? Ind.	570-820 sM	↔
202	<i>Prunella modularis</i>	Heckenbraunelle		§		*	--	A	Z w	4	? BP	1.600.000-1.900.000 BP		
203	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Gimpel		§		*	-	A	J Z W	3	? BP	230.000-330.000 BP		
204	<i>Rallus aquaticus</i>	Wasserralle		§		3	V	-	A	J Z w	3	? BP / ? Ind.	10.000-14.000 BP	
205	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Säbelschnäbler	Anh.1	§§		*	-	A	z		0 BP / ? Ind.	6.000 BP		
206	<i>Regulus ignicapillus</i>	Sommeregoldhähnchen		§		*	--	A	Z	4	? BP	680.000-900.000 BP	↔	
207	<i>Regulus regulus</i>	Wintergoldhähnchen		§		*	--	A	J Z W	4	? BP	920.000-1.200.000 BP	↔	
208	<i>Remiz pendulinus</i>	Beutelmeise		§		R	*	-	A	Z	3	20 BP	3.500-4.500 BP	↔
209	<i>Riparia riparia</i>	Uferschwalbe		§§		3	*	3	A	Z	3	? BP	98.000-170.000 BP	
210	<i>Saxicola rubetra</i>	Braunkehlchen		§		3	3	--	A	Z	4	? Ind.	45.000-68.000 BP	
211	<i>Saxicola rubicola</i>	Schwarzkehlchen		§		2	V	-	A	Z	2	60-120 BP	5.700-7.100 BP	↔
212	<i>Scolopax rusticola</i>	Waldschnepfe		§			V	3	A	J Z w	3	? sM / ? Ind.	23.000-27.000 sM	
213	<i>Serinus serinus</i>	Girlitz		§		*	--	A	Z	4	? BP	210.000-350.000 BP		
214	<i>Sitta europaea</i>	Kleiber		§		*	-	A	J	4	? BP	730.000-950.000 BP	↔	
215	<i>Somateria mollissima</i>	Eiderente		§		*	--	A	z w		0 BP / ? Ind.	1.100-1.300 BP		
216	<i>Sterna caspia</i>	Raubseeschwalbe	Anh.1	§§		1	3	A	z		0 BP / ? Ind.	0-2 BP		
217	<i>Sterna hirundo</i>	Flussseeschwalbe	Anh.1	§§		2	-	A	Z		0 BP / ? Ind.	11.000 BP		
218	<i>Streptopelia decaocto</i>	Türkentaube				*	-	A	J	4	? BP	250.000-300.000 BP	↔	
219	<i>Streptopelia turtur</i>	Turteltaube		§§		3	3	A	Z	3	? BP	51.000-77.000 BP	↔	
220	<i>Strix aluco</i>	Waldkauz		§§		*	--	A	J	4	? BP	59.000-75.000 BP		
221	<i>Sturnus vulgaris</i>	Star		§		*	3	A	Z w	4	? BP	2.300.000-2.800.000 BP	↔	
222	<i>Sylvia atricapilla</i>	Mönchsgrasmücke		§		*	--	A	Z	4	? BP	2.600.000-3.300.000 BP		
223	<i>Sylvia borin</i>	Gartengrasmücke		§		*	--	A	Z	4	? BP	900.000-1.200.000 BP		
224	<i>Sylvia communis</i>	Dorngrasmücke		§		*	--	A	Z	4	? BP	480.000-650.000 BP	↔	
225	<i>Sylvia curruca</i>	Klappergrasmücke		§		*	-	A	Z	4	? BP	300.000-450.000 BP		
226	<i>Sylvia nisona</i>	Sperbergrasmücke	Anh.1	§§		3	*	--	A	z	3	100-120 BP	8.500-13.000 BP	
227	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Zwertgaucher		§		3	*	-	A	J Z w	4	130 BP / ? Ind.	7.300-9.400 BP	
228	<i>Tadorna tadorna</i>	Brandgans		§		R	*	--	A	Z w	2	4-8 BP / ? Ind.	6.200-6.400 BP	
229	<i>Tetrao terix</i>	Birkhuhn	Anh.1	§§		1	2	3	A	J	2	? Ind.	1.000-1.400 BP	↔
230	<i>Tetrao urogallus</i>	Auerhuhn	Anh.1	§§		1	1	-	A	J	2	15-25 Ind.	570-780 BP	↔
231	<i>Tringa erythropus</i>	Dunkler Wasserläufer		§				3	A	Z		0 BP / ? Ind.	0 BP	
232	<i>Tringa glareola</i>	Bruchwasserläufer	Anh.1	§§			1	3	A	Z		0 BP / ? Ind.	0-1 BP	
233	<i>Tringa nebularia</i>	Grünschenkel						-	A	Z		0 BP / ? Ind.	0 BP	
234	<i>Tringa ochropus</i>	Waldwasserläufer		§§		R	*	-	A	Z w	(1)	0 BP / ? Ind.	760-830 BP	
235	<i>Tringa stagnatilis</i>	Teichwasserläufer		§§				-	A	z		0 BP / ? Ind.	0 BP	
236	<i>Tringa totanus</i>	Rotschenkel		§§			V	2	A	Z	(1)		12000 BP	
237	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Zaunkönig		§		*	-	A	J Z w	4	? BP	2.000.000-2.500.000 BP		
238	<i>Turdus iliacus</i>	Rotdrossel		§§		*	--	A	Z w		0 BP / ? Ind.	0 BP		
239	<i>Turdus merula</i>	Amsel		§		*	--	A	J Z W	4	? BP	6.700.000-8.200.000 BP	↔	
240	<i>Turdus philomelos</i>	Singdrossel		§		*	--	A	Z	4	? BP	1.500.000-1.900.000 BP		
241	<i>Turdus pilaris</i>	Wacholderdrossel		§		*	--	A	J Z W	4	? BP	340.000-430.000 BP	↔	
242	<i>Turdus torquatus</i>	Ringdrossel		§		*	--	A	Z	(1)	1 sM	11.000-16.000 BP		
243	<i>Turdus viscivorus</i>	Misteldrossel		§		*	--	A	Z w	4	? BP	280.000-450.000 BP		
244	<i>Tyto alba</i>	Schleiereule		§§		3	*	3	A	J	4	? BP	13.000-18.000 BP	
245	<i>Upupa epops</i>	Wiedehopf		§§		1	2	3	A	z	1	0-1 BP / ? Ind.	380-450 BP	↔
246	<i>Vanellus vanellus</i>	Kiebitz		§§		1	2	2	A	Z	3	150 BP / ? Ind.	68.000-83.000 BP	↔

## Vereinfachte Prüfung:

hellgrün hinterlegt: sog. "Allerweltsarten"

## Schutzstatus:

Anh. 1 Schutzstatus nach Anhang 1 EG-Vogelschutzrichtlinie  
§ entsprechend BNatSchG (2002) § 10 Abs. 1 Nr. 10 besonders geschützt  
§§ entsprechend BNatSchG (2002) § 10 Abs. 1 Nr. 11 streng geschützt

Rote Liste (Wiesner 2001 bzw. Südbeck et al. 2007):

0 ausgestorben, ausgerottet oder verschollen  
1 vom Aussterben bedroht  
2 stark gefährdet  
3 gefährdet  
R extrem selten (rar)  
G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt  
V Vorwarnliste  
\* ungefährdet

SPEC (Bird Life International 2004):

1 Europäische Art von globalen Naturschutzbelang  
2 Globale Population oder Verbreitungsgebiet konzentriert in Europa / Erhaltungsstatus in Europa ungünstig  
3 Globale Population oder Verbreitungsgebiet nicht in Europa konzentriert / Erhaltungsstatus in Europa ungünstig  
-- Globale Population oder Verbreitungsgebiet konzentriert in Europa / Erhaltungsstatus in Europa günstig  
- Globale Population oder Verbreitungsgebiet nicht in Europa konzentriert / Erhaltungsstatus in Europa günstig

## Artstatus Thüringen (Rost & Grimm 2004):

Kategorie:

A Die Art wurde vor und nach dem 01.01.1950 als Wildvogel in Thüringen festgestellt.  
B Die Art wurde lediglich vor 1950 in Thüringen als Wildvogel nachgewiesen  
C Neozoen (eingebürgert oder eingewandert), die regelmäßig nachgewiesen werden  
BD Nachweise vor 1950 werden als wahrscheinliche Wildvögel eingestuft, Meldungen seit 1950 als Gefangenschaftsflüchtlinge

Brutstatus

0 Ehemaliger Brutvogel, seit 1950 kein Brutnachweis  
1 War vor 1950 zumindest zeitweilig regelmäßiger Brutvogel, ist nach 1950 entweder verschwunden oder unregelmäßiger Brutvogel in wenigen Paaren  
(1) Hat seit 1850 ausnahmsweise einmal oder mehrfach gebrütet, ist aber kein regelmäßiger Brutvogel  
2 Brütet jedes oder fast jedes Jahr, aber nur lokal und in sehr geringer Zahl  
3 Regelmäßiger Brutvogel, jedoch nur in bestimmten Regionen oder nur lokal in größeren Beständen  
4 Regelmäßiger Brutvogel in geeigneten Lebensräumen in weiten Teilen Thüringens

Jahreszeitlicher Status

J Jahresvogel, Brut- und Winterpopulation nicht immer identisch  
Z Zugvogel und Durchzügler, der überwiegende Teil der Brutvögel verläßt Thüringen im Winter, Brutvögel anderer Population ziehen häufig durch  
z Brutvögel anderer Populationen ziehen nur ausnahmsweise > 50 Ind. Pro Jahr durch  
W Wintergast, Vögel meist nordöstlicher Herkunft überwintern regelmäßig zumindest in einzelnen Landesteilen  
w Winterbestand mehr oder minder regelmäßig, aber nur ein Bruchteil der Sommerbestände  
A Ausnahmeerscheinung, seit 1980 gab es in höchstens der Hälfte der Jahre Nachweise und dann nicht mehr als durchschnittlich 3 pro Jahr  
a es liegen seit 1950 maximal 5 Nachweise vor

## Bestand

BP Brutpaare  
RP Revierpaare  
HP Horstpaare  
sM singende Männchen  
W Weibchen  
Ind Individuen

## Trend (aktuelle gutachterliche Einschätzung)

rot abnehmend  
gelb gleichbleibend oder unbekannt  
grün zunehmend